

♂ Long. 2,2.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, avec une ligne marginale et des lignes rayonnantes peu indiquées, noirâtres, presque lisse, peu élevé, de même forme que chez *G. agreste*. — Yeux antérieurs en ligne droite par leurs sommets; les médians presque de moitié plus petits, équidistants et resserrés, leurs intervalles néanmoins plus larges que le rayon des médians. Yeux supérieurs en ligne à




Fig. 283.



Fig. 284.

peine courbée en arrière; les médians un peu plus petits, leur intervalle environ de moitié plus large que leur diamètre; celui des latéraux à peine aussi large que ce diamètre. Yeux médians en trapèze plus long que large. — Bandeau plus étroit que l'aire oculaire, un peu concave au-dessous des yeux. — Chélicères peu convexes, inermes en avant. — Plastron noirâtre, lisse. — Pattes longues (beaucoup plus que chez *agreste*) et peu robustes, fauves, avec les fémurs teintés de rouge; épines fines, environ de la longueur du diamètre des articles aux paires antérieures, plus longues aux postérieures. — Patte-mâchoire fauve; fémur un peu courbe, à peine atténué à la base; patella très étroite, cylindrique, plus de trois fois plus longue que large; tibia presque aussi long, légèrement élargi à l'extrémité, et tronqué avec l'angle externe, pourvu d'une petite apophyse noire conique au moins trois fois plus courte que le corps

de l'article et dirigée en avant, sans tige en avant; tarse à peine plus long et plus large que le tibia, peu atténué, très obtus.

Je ne connais pas la femelle.

Valais : glacier du Gorner, à 1800 mètres d'altitude!